


# JALU-TOXIN

PROTOCOLLO  
PROF. LUCA PIOVANO



**RUGHE DELLA FRONTE**  
1,5-2ML

**ZAMPE DI GALLINA**  
0,5-0,6ML PER OGNI AREA

**CODICE A BARRE**  
0,5-0,7ML

**MENTO**  
1ML

**COLLO E  
DECOLLÉTE**  
2-3ML\*

\*SUL COLLO È POSSIBILE AUMENTARE FINO AL DOPPIO DELLE UNITÀ DI BOTOX

## PROTOCOLLO

JALU-TOXIN

15 GIORNI

JALUPRO

15 GIORNI

JALUPRO

NON RIPETERE JALU-TOXIN PRIMA DI 3 MESI

- 1** DILUIRE LA TOSSINA BOTULINICA CON SOLUZIONE SALINA (ES. 50 U DI ONABOTULINUM IN 1,25ML O 125 U DI ABOBOTULINUM IN 0,63ML).
- 2** DILUIRE JALUPRO COME SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI (3ML DI HA CON POLVERE DI AMINOACIDI LIOFILIZZATI).
- 3** USARE 2 SIRINGHE LUER-LOCK PER MISCELARE JALUPRO E BTX: PRENDERE 1ML DI JALUPRO IN UNA SIRINGA DA 2,5ML E 10-14 U DI ONABOTULINUM O 25-30 U DI ABOBOTULINUM IN UNA SIRINGA DA 1ML, COLLEGARE LE DUE SIRINGHE CON UN CONNETTORE E MISCELARE.
- 4** INIETTARE IL COCKTAIL NEL DERMA SUPERFICIALE CON LA TECNICA A MICROPAPULE. STESSO NUMERO DI INIEZIONI DA ENTRAMBI I LATI PER EVITARE ASIMMETRIE.